

**TERAVILI JA KAUNVILI.
Kahjuritega nakatatusse määramine**

**Cereals and pulses.
Determination of insect infestation**

**Зерновые и бобовые.
Методы определения зараженности
вредителями**



EESSÕNA

Eesti standardi EVS 679:1995 "Teravili ja kaunvili. Kahjuritega nakatatus määramine" on koostanud Riigi Viljasalv.

Standardi on kooskõlastanud Riigi Tervisekaitseamet ja Riigi Taimekarantiini Inspeksioon.

Standard on koostatud esmakordselt.

Standard on heaks kiidetud Standardiameti standardikomisjoni poolt.

Standard on kinnitatud ja kasutusele võetud Standardiameti käskkirjaga

27.11.1995 nr.14.

Registrisse kantud 27.11.1995 nr.1094.

Standard on ette nähtud juhendumiseks kõigile teravilja käitlemisega tegelevatele ettevõtetele.

Standardi koostamisel on lähtutud teatmelisas A toodud standarditest.

TERAVILI JA KAUNVILI.Kahjuritega nakatatus määramine

1 KÄSITLUSALA

Käesolev standard käsitleb tera- ja kaunvilja (edaspidi "vilja") kahjuritega nakatatus (varjatud ja nähtaval kujul) määramise meetodeid.

2 NORMATIIVVIITED

Käesolevas standardis on viidatud alljärgnevale dokumendile:
EVS 657:1995 Teravili ja kaunvili. Proovivõtt.

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED

Käesolevas standardis kasutatakse järgmisi termineid ja määratlusi:

3.1 Nähtaval kujul nakatatus on elusate (igas arengufaasis) kahjurite olemasolu terade/seemnete vahelises ruumis.

3.2 Varjatud kujul nakatatus on elusate (igas arengufaasis) kahjurite olemasolu üksikute terade või kaunviljade (seemnete) sees.

4 TÖÖVAHENDID

4.1 Nähtaval kujul nakatatus määramisel kasutatavad töövahendid:

4.1.1 Kaalud lubatud vea piiriga ± 10 g (kaunviljade puhul ± 1 g)

4.1.2 Laboratoorsete sõelte komplekt, mis koosneb sõeltest silma läbimõõduga 1,5 mm ja 2,5 mm

4.1.3 Teraviljaluup suurendusega 4 kuni 5 korda

4.1.4 Analüüsilaud valge ja musta klaasiga

4.1.5 Liivakell 1 min või 2 min

4.1.6 Termomeeter